

Латинское название

Ercefuryl

Показания к применению

A04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточненная, A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (дизентерия, диарея бактериальная)

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Можно назначать кормящим женщинам.

Фармакологическое действие

Эрсефурил – кишечный антисептик, противодиарейный препарат.

Как и другие нитрофураны блокирует некоторые окислительно-восстановительные энзимные реакции в клетках микроорганизмов.

При применении в терапевтических дозах оказывает бактериостатическое действие, в высоких дозах - бактерицидное. Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Clostridium*) и грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiela*, *Enterobacter*, *Vibrio cholerae* и др.) микроорганизмов. Не влияет на сапрофитную флору (не вызывает дисбактериоза). К препарату не развивается резистентность бактериальных штаммов.

Форма выпуска



Капсулы.

Состав

1 капсула содержит нифуроксазида 200 мг;

вспомогательные вещества: сахароза 72 мг, магния стеарат 1.8 мг, крахмал кукурузный 88 мг;

состав оболочки капсул: желатин, титана диоксид, железа оксид желтый, вода.

Взаимодействие

Прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности. Не рекомендуется прием препарата в комбинации с препаратами, ведущими к реакциям типа синдрома отмена или антидепрессантами.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым - по 1 капсуле 4 раза в день (800 мг). Детям старше 6 лет по 200 мг 3 раза в сутки (600 мг). Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным нитрофурана); детский возраст до 6 лет.

Особые указания

При необходимости следует проводить регидратацию. Объем вводимой жидкости и способ ее введения (внутрь, в/в) должен соответствовать степени выраженности диареи, возрасту и клиническому состоянию больного. В случае инфекционной диареи с клиническими симптомами, указывающими на инвазивное явление, необходима систематическая антибактериальная терапия. В связи с присутствием в препарате сахарозы, его не следует назначать при непереносимости фруктозы, синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефиците сахаразы-изомальтазы.

Показания

Эрсефурил, показания к применению

Острая бактериальная диарея.

Побочные действия

Крайне редко возможны аллергические реакции, такие как кожные высыпания, крапивница, отек Квинке или анафилактический шок.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 30°C в сухом месте.

Срок годности

5 лет.

Упаковка

14 или 28 шт. в упаковке.